

АЛГОРИТМ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВЦЯ ПРИ ТРАВМАХ

Якщо ви **отримали травму**, дійте **за наступним алгоритмом** профілактики правця з урахуванням наявних у вас щеплень та характеристик травми.

Важливо! Особа **вважається захищеною** проти правця, якщо вона отримала щонайменше **три щеплення** і від останнього щеплення/ревакцинації минуло **менше ніж 5 років**. У такому випадку імунопрофілактика правця **не проводиться**.

УВАГА! Якщо травма отримана **при укусі твариною** – зверніться до травматологічного пункту для отримання імунопрофілактики **скажу!**

Якщо вакцинація **раніше не проводилася взагалі, було отримано дві або менше дози чи дані про вакцинацію взагалі відсутні**, то дійте за наступним алгоритмом, залежно від характеристики рани (інфікована/або неінфікована).



Анамнез вакцинації проти правця	«Неінфікована рана»		«Інфікована рана»	
	Вакцина, що містить правцевий анатоксин (АП)	ППС/ППЛІ (протиправцева сироватка /протиправцевий людський імуноглобулін)	Вакцина, що містить правцевий анатоксин (АП)	ППС/ППЛІ (протиправцева сироватка /протиправцевий людський імуноглобулін)
Невідомий, або <3 доз серії вакцинації	Так	Ні	Так	Так
3 та > доз та <5 років від останньої ревакцинації	Ні	Ні	Ні	Ні
3 та > доз та термін 5-10 років від останньої ревакцинації	Ні	Ні	Так	Ні
3 та > доз та термін >10 років від останньої ревакцинації	Так	Ні	Так	Ні

АП – анатоксин правцевий; **ППЛІ** – протиправцевий людський імуноглобулін;

ППС – протиправцева сироватка.

«Інфікована рана» - існує високий ризик потрапляння збудника правця в рану

Клінічні ознаки	«Інфікована рана»	«Неінфікована рана»
Час, який минув після травмування	Більше ніж 6 год.	Менше ніж 6 год.
Конфігурація рани	Колота рана, садна, розрив, ампутація, мацерація, відкритий перелом	«лінійні рани» (вузькі, довгі з лінійними краями)
Глибина рани	Більше ніж 1 см	До 1 см
Механізм нанесення рани	Вогнепальна рана, прокол, стиснення, опік, відмороження	Гострі предмети (ніж, скло тощо)
Нежиттєздатні тканини	Є	Немає
Контамінація (ґрунт, феєс, тканина, скалка тощо)	Є	Немає

Інформація у флаєрі є адаптованою з використанням чинного наказу МОЗ України (наказ МОЗ України № 198 від 05.08.1999 «Про вдосконалення профілактики, діагностики та лікування правця»; наказ МОЗ України № 205 від 15.04.2004 «Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ») та міжнародних рекомендацій (Канада; Австралія).


До «Інфікованої рани» також ЗАВЖДИ належать:

- пологи поза медичним закладом;
- пупкова рана при пологах поза медичним закладом;
- позалікарняний аборт;
- проникні рани кишківника;
- абсцеси;
- некрози;
- укуси тваринами;
- опіки.

Більше про вакцини та щеплення читайте тут



Розробка і друк листівки стали можливими завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в межах проекту «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я», який впроваджує організація Пакт. Зміст є відповідальністю ГС "Коаліція за вакцинацію" і не обов'язково відображає погляди USAID або Уряду США.



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



ЦЕНТРИ
КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ
ХВОРОБ



USAID
ВІД АМЕРИКАНСЬКОГО НАРОДУ



vaccine.org.ua

РОЗБУДОВА СТИЙКОЇ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я